

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie
Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Incidente con contraccettivo patch 21 giorni su 28



ATTENZIONE: l'effetto contraccettivo può essere diminuito se il patch si scolla, quindi è meglio metterlo in una zona del corpo che sia ben controllabile, evitando creme o prodotti di bellezza che possono sfavorirne l'aderenza. Se il patch s'incolla sugli abiti o su se stesso, è meglio metterne uno nuovo. Non utilizzi un adesivo supplementare per migliorare l'aderenza.

ATTENZIONE: Se nei **giorni precedenti l'incidente** ha avuto un rapporto sessuale senza preservativo, il rischio di una gravidanza non desiderata esiste. L'utilizzo di una **contraccezione d'urgenza** è consigliato. In caso contrario segua le indicazioni che seguono.

Se il 1° patch (giorno 1 a giorno 7) si scolla parzialmente per meno di 24 ore:

- 1° ricolli allo stesso posto o incollarne uno nuovo allo stesso posto.
- 2° non ci sarà bisogno di utilizzare il preservativo nei giorni successivi se ha rapporti sessuali.

Se il 2° patch (giorno 8 a giorno 14) si scolla parzialmente o se ha semplicemente scordato di sostituire il 1° in un intervallo inferiore a 48 ore:

- 1° applichi un nuovo patch subito che resterà il tempo inizialmente previsto (fino a giorno 14).
- 2° non ci sarà bisogno di utilizzare il preservativo nei giorni successivi se ha rapporti sessuali.

Se il 3° patch (giorno 15 a giorno 21) si scolla parzialmente o se ha semplicemente scordato di sostituire il 2° in un intervallo inferiore a 48 ore:

- 1° applichi un nuovo patch subito, esso resterà il tempo inizialmente previsto (fino a giorno 21).
- 2° non ci sarà bisogno di utilizzare il preservativo nei giorni successivi se ha rapporti sessuali.

Se il 3° patch (giorno 15 a giorno 21) è rimasto sulla pelle oltre i 21 giorni:

- 1° tolga il patch
- 2° faccia una pausa "ridotta" fino al giorno 28
- 3° ricominci un ciclo al giorno 29 (= giorno 1)

Nel caso in cui ha dimenticato di sostituire il patch o di ricominciarlo dopo i 7 giorni di pausa:

- 1° incollati subito un nuovo patch che resterà per 7 giorni.
- 2° se ha rapporti sessuali nei 7 giorni seguenti deve utilizzare un preservativo.

Se il patch si è scollato o se ha semplicemente scordato di sostituirlo in un intervallo superiore a 48 ore:

- 1° ricominci da subito un ciclo di 3 patch con 7 giorni di pausa in seguito.
- 2° se ha rapporti sessuali nei 7 giorni successivi l'incidente, deve utilizzare un preservativo.

Voglia attenersi anche alle altre indicazioni contenute nel foglietto illustrativo