

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie
Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092


Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Idrosonografia




I polipi vengono generalmente trovati attraverso un'**ecografia transvaginale**, tuttavia, per confermare la diagnosi, si può realizzare un'ecografia tridimensionale o anche un'idrosonografia.

- L'**ecografia transvaginale** permette di vedere l'utero in più piani con un'immagine d'alta qualità.
- L'**idrosonografia** consiste nella realizzazione di un'ecografia transvaginale, aggiungendo per via vaginale una soluzione salina, o siero sterile, per **distanziare le pareti interne dell'utero e avere così una miglior visione del polipo**.

Il trattamento consiste generalmente nell'**estirpamento del polipo**, o polipectomia, abitualmente realizzato mediante **isteroscopia**.

L'**isteroscopia** è un'operazione chirurgica minore e ambulatoriale, che consiste nell'introdurre all'interno della cavità uterina un endoscopio con un piccolo strumento per operare, una fonte di luce e una piccola telecamera che permette di avere un'immagine dell'interno della cavità.

I polipi di piccole dimensioni possono anche essere eliminati mediante il raschiamento della cavità uterina.



Indipendentemente dalla tecnica impiegata, una volta estratto, il polipo viene inviato in laboratorio, per analizzarlo e confermare che si tratti di un polipo benigno.

Esiste una serie di fattori che può aumentare il rischio di soffrire di polipi uterini:

- Donne con **obesità**.
- Concentrazione elevata di **estrogeni**.
- **Anovulazione cronica**.
- **Insufficienza luteale**.
- **Età**: i rischi aumentano col passare degli anni.
- Uso di **tamoxifene**, farmaco utilizzato nel trattamento del cancro al seno.
- Donne con **ipertensione arteriosa**.
- **Infiammazione uterina cronica**.

Causa d'infertilità

I polipi sono in relazione con l'infertilità, dal momento che possono rappresentare una causa di aborto spontaneo, **impedire l'annidamento** dell'embrione o anche ostacolare il cammino degli spermatozoi verso l'ovulo, a seconda dello spazio che occupa il polipo all'interno della cavità uterina.

I polipi piccoli, di meno di 2 cm, non riducono i tassi di gravidanza, è però noto che possono essere causa di aborto.

Tra il 15% e 24% delle donne con problemi di sterilità presenta polipi nell'utero.

Nelle pazienti che si sottopongono a trattamenti di riproduzione assistita, la diagnosi di polipi è di solito rapida. Infatti, una delle prime analisi che vengono fatte alla paziente è un'ecografia transvaginale, che permette di ottenere indizi sulla presenza di polipi. In caso affermativo, la paziente viene sottoposta a un'isteroscopia operatoria.