

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie
Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO Tel. **0041 76 51 60300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Gravidanza non desiderata



Ritardo delle mestruazioni: dopo un test di gravidanza urinario acquistato nel commercio, che darà risultato positivo, vi sarà qualche giorno di disorientamento e di discussione. Potrete allora prendere la decisione di proseguire o interrompere la gravidanza. A questo punto sarete già oltre la quinta settimana di amenorrea. È importante reagire rapidamente poiché prima viene effettuata l'ecografia di controllo per accertare l'avanzamento e la localizzazione della gravidanza e prima potremo consigliarvi il metodo più efficace e meno doloroso.

Se siete decise a interrompere la gravidanza esistono 2 metodi:

1. **Metodo farmacologico:** entro le 7 settimane
2. **Metodo chirurgico:** tra la 7^a e la 12^a settimana

1. Metodo farmacologico

Questo metodo può essere utilizzato entro il 49° giorno di amenorrea, ovvero entro sette settimane.

Una volta datata e localizzata la gravidanza si procederà alla somministrazione della RU 486 sottoforma di 3 compresse assunte per via orale, subito, durante la stessa consultazione. In questo momento s'interromperà l'evoluzione della gravidanza. Dopo 48 ore, si assumerà a domicilio 1 o 2 dosi di prostaglandine che provocheranno una mestruazione che permetterà l'espulsione della gravidanza.

Nel 95% dei casi l'espulsione del materiale avverrà poche ore dopo la dose di prostaglandine, solo nel 5% dei casi l'espulsione del materiale avverrà nei giorni successivi.

Quello che lei avrà è una mestruazione che normalmente si presenta un po' più dolorosa e abbondante della norma. A volte il ciclo mestruale provocato potrà essere abbondante e doloroso,

questo dipende anche da fattori psicologici che un'interruzione di gravidanza scatena nella donna, ma non sarà mai pericoloso. Seguiranno un paio di giorni di sanguinamento abbondante, poi una decina con un sanguinamento leggero.

Un controllo ecografico sarà pianificato 10 giorni dopo l'assunzione delle prostaglandine per confermare il successo del trattamento.

Questo metodo ha la caratteristica di essere molto fisiologico e dunque di non interferire con la fertilità e pertanto non preclude ulteriori gravidanze. **Contro-indicazioni** di RU486: Insufficienza surrenale cronica, asma severa o porfiria congenita.

2. **Metodo chirurgico:** consiste in un'isterosuzione della cavità uterina in anestesia generale. Questa procedura è comunemente chiamata raschiamento uterino.

Se effettuato nelle regole dell'arte, è sicuro e poco nocivo per il vostro organismo e non precluderà la possibilità di una nuova gravidanza in futuro.

Viene effettuato in regime di day hospital, con una degenza di qualche ora, normalmente è poco doloroso e poco emorragico, permette di ritornare alle attività quotidiane 48 ore più tardi.

Contracezione: la consultazione ginecologica di controllo che seguirà sarà anche utile per ridiscutere il vostro metodo contraccettivo.