

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie
Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Interventi diagnostici per l'infertilità



La difficoltà a concepire è un problema di coppia molto diffuso le cui cause sono condivise tra l'uomo e la donna.

Nell'uomo, s'inizia con un'anamnesi dettagliata per escludere antecedenti personali o famigliari d'infertilità, contatto con sostanze tossiche, professioni a rischio, stile di vita e consumo di sostanze pericolose, malattie croniche come diabete o ipertensione, problemi meccanici ecc. In seguito, viene effettuata un'analisi di base: lo spermioγραμμα, lo spermocitogramma e la spermocultura.

Nella donna, che deve fornire l'ovocita e accogliere la gravidanza per 9 mesi il bilancio è più complesso.

- 1) bilancio dei rischi di una gravidanza
 - 2) bilancio ormonale e riserva ovarica
 - 3) permeabilità tubarica
 - 4) qualità della cavità uterina
-
- 1) **Bilancio dei rischi di una gravidanza:** vedi scheda relativa a "Consultazione preconcezionale".
 - 2) **Bilancio ormonale:** la sua utilità indiscussa serve a diagnosticare delle disfunzioni dell'ovulazione, a determinare la riserva ovarica e l'eventuale urgenza a dirigersi verso una FIV.

→ Conto follicolare a g3
 - 3) **Permeabilità tubarica:** per permettere ai 2 gameti di incontrarsi le tube devono essere permeabili e funzionanti. La presenza d'idrosalpinge diminuisce il tasso di successo di un'eventuale FIV.

→ Isterosalpingografia

→ Laparoscopia diagnostica con test al blu di metilene

→ Salpingectomia bilaterale nel caso di una FIV pianificata

4) **Qualità della cavità uterina:** per l'annidamento dell'embrione la cavità deve essere preparata dagli ormoni endogeni o esogeni. La presenza di una malformazione uterina, di un mioma che deforma la cavità o di un polipo può interferire con questa tappa della concezione.

→ Ecografia uterina 3D

→ Idrosonografia

→ Isteroscopia diagnostica → eventuale asportazione del mioma o del polipo