

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie
Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Isterosalpingografia



L'isterosalpingografia è un esame radiologico dell'utero e delle tube necessario per verificare la permeabilità delle vie genitali, la loro morfologia e l'eventuale presenza di lesioni patologiche. Consiste nell'iniettare, attraverso il collo uterino, un liquido di contrasto opaco e nell'eseguire una serie di radiografie per studiarne il percorso.



Tale esame viene praticato frequentemente nella diagnostica per la sterilità e viene impiegato anche per studiare la causa di aborti ripetuti. Deve essere eseguita preferibilmente nella prima parte del ciclo (normalmente dal 1° al 14° giorno) per evitare che l'immissione del liquido di contrasto all'interno dell'utero possa interferire con un'eventuale gravidanza in fase iniziale.

Nel documentare l'aspetto della cavità uterina, l'isterosalpingografia può evidenziare la presenza di fibromi sottomucosi che alterano la cavità stessa. In caso di fibromi in prossimità degli angoli tubarici l'isterosalpingografia può evidenziare l'eventuale occlusione delle tube.

È un esame a volte doloroso e non privo di complicazioni. Durante l'esame la donna è stesa con i piedi posizionati come per eseguire una visita ginecologica. Uno speculum viene inserito in vagina per mantenere le pareti vaginali divaricate e consentire la visualizzazione del collo. Quest'ultima viene disinfettata e potrebbe essere iniettato un anestetico locale; quando viene eseguita l'anestesia, si può sentire una sorta di puntura o un lieve dolore. Viene poi posto sull'addome un apparecchio radiografico che consente allo specialista di verificare su un monitor il percorso del liquido di contrasto all'interno del corpo; questo passa lentamente nell'utero e nelle tube di Falloppio attraverso il sottile catetere. Dura all'incirca 20 minuti e dopo l'esame non si è in grado di guidare. Per ridurre il fastidio si può prendere un antidolorifico.

Molte donne presentano lievi effetti collaterali dopo aver eseguito un'isterosalpingografia; questi non sono importanti e nella maggior parte dei casi scompaiono dopo un paio di giorni. Gli effetti collaterali possono consistere in perdite vaginali vischiose quando parte del fluido fuoriesce dall'utero, sensazione di vertigini, crampi, debolezza o nausea, lieve sanguinamento vaginale. Solitamente non si manifestano gravi problemi; nel caso in cui questi si presentassero, potrebbero comprendere una reazione allergica al mezzo di contrasto, una lesione dell'utero o un'infezione pelvica.

È necessario consultare se si hanno sintomi quali vomito, debolezza, severi dolori addominali o crampi, sanguinamento vaginale emorragico, febbre o brividi.

Solitamente non viene eseguita se una donna ha un'infezione pelvica, se è allergica al liquido di contrasto utilizzato nella procedura o se presenta un sanguinamento uterino importante.

