

## STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

**Specialista FMH** Ginecologia & Ostetricia Operatorie  
Medicina complementare integrata

**Via Nassa 46 – 6900 LUGANO**

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

**Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO**

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092


Mail Address: [levatrice@studioginecologiabattaglia.com](mailto:levatrice@studioginecologiabattaglia.com)

Web site: [www.studioginecologiabattaglia.com](http://www.studioginecologiabattaglia.com)

FB e Instagram: [studioginecologiabattaglia](https://www.facebook.com/studioginecologiabattaglia)




## Polipo endouterino



Esistono vari fattori che possono aumentare il rischio di soffrire di polipi uterini:

- **Obesità.**
- Concentrazione elevata di **estrogeni**.
- **Anovulazione cronica**, ossia ciclo mestruale senza ovociti.
- **Insufficienza luteale**.
- **Età**: i rischi aumentano col passare degli anni.
- Uso di **tamoxifene**, farmaco utilizzato nel trattamento del cancro al seno.
- **Ipertensione arteriosa**.
- **Infiammazione uterina cronica**.

I polipi sono in relazione con l'infertilità, in quanto possono rappresentare una causa di aborto spontaneo, **impedire l'annidamento** dell'embrione o anche ostacolare il cammino degli spermatozoi verso l'ovulo, a seconda dello spazio che il polipo occupa all'interno della cavità uterina. I polipi piccoli (< 2 cm) non riducono i tassi di gravidanza, è però noto che possono essere causa di aborto.



Tra il 15% e il 24% delle donne con problemi di sterilità presenta polipi nell'utero.

Nelle pazienti che si sottopongono a trattamenti di riproduzione assistita, la diagnosi di polipi è di solito rapida. Infatti, una delle prime analisi che vengono fatte alla paziente è un'ecografia transvaginale, che permette di ottenere indizi sulla presenza di polipi. In caso affermativo, la paziente viene sottoposta a un'isteroscopia.

**Trattamento:** Il trattamento consiste generalmente nell'**estirpamento del polipo**, o polipectomia, abitualmente realizzato mediante **isteroscopia**.

L'**isteroscopia** è un'operazione chirurgica minore e ambulatoriale, che consiste nell'introdurre all'interno della cavità uterina un endoscopio con un piccolo strumento per operare, una luce e una piccola telecamera che permette di avere un'immagine digitale dell'interno della cavità.

I polipi di piccole dimensioni possono anche essere eliminati mediante il raschiamento della cavità uterina.

Indipendentemente dalla tecnica impiegata, una volta estratto il polipo viene inviato in laboratorio, per l'analisi e confermare che si tratti di un polipo benigno.

