

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie

Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Epatite B

Fonte: Ufficio Federale della Sanità Pubblica – Divisione della Salute Pubblica, Ufficio del Medico Cantonale

Agente patogeno e trasmissione

L'epatite B è una malattia infettiva del fegato causata dal virus dell'epatite B. Il virus è molto contagioso e facilmente trasmissibile attraverso il contatto con i liquidi corporei (in particolare il sangue e le secrezioni genitali) di persone infette, sia durante un rapporto sessuale (genitale, anale, orale) o attraverso la condivisione di siringhe, sia tramite il contatto con piccole lesioni cutanee o con le mucose. Le madri infette possono trasmettere la malattia al figlio durante il parto.

Sintomi

Il decorso clinico è altamente variabile. Circa un terzo dei pazienti, sviluppa una malattia senza sintomi e quindi passa completamente inosservata. Nella situazione classica di epatite B, i sintomi non specifici quali la perdita di appetito, nausea, vomito, dolori addominali, dolori articolari, febbre ed eruzioni cutanee si verificano da 45 a 180 giorni dopo l'infezione. L'itterizia non appare in tutti i casi. L'epatite B acuta di solito guarisce completamente, e causa il decesso in meno dell'1% dei malati. Tuttavia circa il 5-10% dei pazienti adulti con infezione e il 90% dei neonati contagiati durante la nascita possono sviluppare una malattia cronica che può portare a cirrosi o cancro del fegato.

Epidemiologia

L'epatite B è diffusa in tutto il mondo, ma specialmente in Asia, Vicino e Medio Oriente, Africa e in alcune zone dell'America, dove il tasso di infezione raggiunge spesso il 60% in della popolazione. In Svizzera, circa 300-500 persone sono affette da epatite B ogni anno. La maggior parte delle infezioni si verifica tra i giovani adulti.

Prevenzione

La vaccinazione è raccomandata per tutti i bambini e gli adolescenti e ad alcuni gruppi a rischio. Praticare sesso sicuro, non condividere siringhe e rinunciare a tatuaggi in paesi con un alto grado di contaminazione diminuiscono inoltre il rischio di contrarre la malattia.