

## STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

**Specialista FMH** Ginecologia & Ostetricia Operatorie  
Medicina complementare integrata

**Via Nassa 46 – 6900 LUGANO**

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

**Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO**

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: [levatrice@studioginecologiabattaglia.com](mailto:levatrice@studioginecologiabattaglia.com)

Web site: [www.studioginecologiabattaglia.com](http://www.studioginecologiabattaglia.com)

FB e Instagram: [studioginecologiabattaglia](https://www.facebook.com/studioginecologiabattaglia)



## TEST DI GRAVIDANZA



I test di gravidanza possono essere eseguiti su urine (test casalingo) oppure su sangue tramite un prelievo venoso. In entrambi i casi si va a ricercare la presenza di una sostanza prodotta direttamente dall'embrione chiamata  $\beta$ hCG.

Ad oggi i test sul mercato garantiscono un'alta affidabilità, intorno al 90%, ed è doveroso chiarire che i falsi positivi sono assai rari, più frequenti possono essere invece i falsi negativi.

I falsi positivi si verificano in caso di assunzione di particolari farmaci per l'induzione dell'ovulazione nei trattamenti per la procreazione assistita, oppure in presenza di gravi patologie dell'ovaio, di conseguenza in caso di test positivo generalmente si ha conferma dello stato di gravidanza.

I falsi negativi invece sono a volte correlati ad un'esecuzione del test o scorretta o troppo precoce rispetto all'ultima mestruazione. Si consiglia infatti di eseguire i test casalinghi utilizzando la prima pipì del mattino preferibilmente aspettando il giorno dell'ipotetica mestruazione mancata, tuttavia molti test hanno una buona affidabilità già alcuni giorni antecedenti all'ipotetica mestruazione mancata. In caso di test negativo si consiglia di attendere qualche giorno (2 o 3) e di ripetere il test. A volte invece il risultato può apparire dubbio: anche in questo caso è bene aspettare qualche giorno e ripetere il test. Nel caso in cui una linea o entrambe appaiano sbiadite il test è da considerarsi ugualmente positivo.

Se il test sulle urine è positivo non è necessario dosare le  $\beta$ hCG anche sul sangue. Il test ematico per la diagnosi di gravidanza viene eseguito in ambito ospedaliero o presso uno studio medico solo in caso di necessità, spesso per valutare l'evoluzione della gravidanza durante le prime settimane.