

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie

Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Iniezione trimestrale



Soluzione somministrata per via intramuscolare ogni tre mesi in dosi da 150 mg.

La prima iniezione deve effettuarsi immediatamente dopo il parto o entro i primi 5 giorni del ciclo mestruale. Le successive somministrazioni ogni 12 settimane.

EFFICACIA: ricerche promosse dall'OMS hanno dimostrato che la percentuale di gravidanze oscilla tra 0 e 0,77 per cento anni-donna.

SVANTAGGI: irregolarità mestruali, cefalea e aumento del peso corporeo nel 1-3% dei casi.

Dopo il sesto mese il 50% delle donne va in amenorrea e l'altro 50% ha sanguinamenti irregolari che a volte possono essere molto sgradevoli.

Dopo l'ultima iniezione, il tempo medio richiesto per un concepimento è di circa 8-9 mesi. È sconsigliato un trattamento superiore ai 2 anni a causa dell'aumento di osteoporosi.

VANTAGGI: per donne che nel post partum desiderano una contraccezione assolutamente efficace e desiderano allattare. Per donne mentalmente compromesse, non in grado di controllare con altri metodi l'insorgenza di una gravidanza o dove non è possibile una somministrazione giornaliera.