

STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

Specialista FMH Ginecologia & Ostetricia Operatorie
Medicina complementare integrata

Via Nassa 46 – 6900 LUGANO

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: levatrice@studioginecologiabattaglia.com

Web site: www.studioginecologiabattaglia.com

FB e Instagram: studioginecologiabattaglia



Ritenzione urinaria

La ritenzione urinaria si suddivide in acuta (completa e improvvisa incapacità ad urinare) o cronica (continua o ricorrente) e, come suggerisce il nome, consiste nella permanenza dell'urina in vescica a causa dell'incapacità a urinare.

L'accumularsi di urina in vescica dà origine a un dolore intenso.

In caso di ritenzione cronica (solitamente però indolore) può essere espulsa una piccola quantità di urina, ma la vescica non si svuota completamente. In genere la forma cronica è preceduta da un periodo di disturbi urinari quali disuria, getto debole e/o intermittente, senso di svuotamento vescicale incompleto con comparsa di residuo di urina in vescica che peggiora progressivamente.

La ritenzione urinaria può essere inoltre completa (con impossibilità totale di urinare) o incompleta (quando le minzioni sono conservate, ma è presente un elevato residuo di urina in vescica).

La ritenzione può verificarsi a causa di un'ostruzione (come un calcolo in vescica, in genere meno frequente nella donna), in seguito a danni nervosi, a causa di motivi psicologici, in seguito ad interventi chirurgici o all'assunzione di determinati farmaci o a causa di un'infezione.