

# STUDIO GINECOLOGIA BATTAGLIA

Ecografia diagnostica

**Specialista FMH** Ginecologia & Ostetricia Operatorie  
Medicina complementare integrata

**Via Nassa 46 – 6900 LUGANO**

Tel. 0041 91 9232242

Fax 0041 91 9227166

**Via Cantonale 54 – 6983 MAGLIASO**

Tel. **0041 76 5160300**

Fax 0041 91 6009092

Mail Address: [levatrice@studioginecologiabattaglia.com](mailto:levatrice@studioginecologiabattaglia.com)

Web site: [www.studioginecologiabattaglia.com](http://www.studioginecologiabattaglia.com)

FB e Instagram: [studioginecologiabattaglia](https://www.facebook.com/studioginecologiabattaglia)



## PRURITO VULVARE: CAUSE ONCOLOGICHE

### 1. Condilomi vulvari

Appaiono come verruche acuminate o piatte, isolate o a gruppi, singole o a grappolo che interessano la zona genitale ed anale sia nell'uomo che nella donna. Queste lesioni sono dovute dall'infezione da HPV a trasmissione sessuale, in genere si tratta di formazioni benigne, tuttavia in alcuni casi possono nel corso del tempo subire modificazioni e dare origine ad un carcinoma (evento piuttosto raro). Si manifestano circa 4 settimane dopo l'avvenuto contagio e sono facilmente trasmissibili anche attraverso il semplice contatto cutaneo superficiale o la condivisione di oggetti contaminati (indumenti intimi, salviette da bagno). Non sono in genere particolarmente dolorose, ma possono dare prurito e fastidio oppure rompersi, quindi sanguinare ed infettarsi ad opera di germi opportunisti.

La diagnosi avviene attraverso una visita ginecologica che permette anche di distinguere i condilomi da altri tipi di verruche genitali.

Il trattamento consiste nell'asportazione delle verruche attraverso crioterapia, bruciatura, eradicazione chirurgica, laser o farmaci specifici, tuttavia l'infezione non viene debellata dall'organismo e a volte i condilomi asportati ricompaiono. Tali procedure possono e devono essere eseguite solo dal medico specialista e sono da escludersi qualsiasi pratica di automedicazione.

- 2. Malattia di Bowen:** malattia cutanea precancerosa che se non trattata può evolvere verso il tumore maligno delle cellule di Malpighi. L'età avanzata e l'esposizione al sole sono fattori predisponenti, inoltre sembra esista una correlazione con l'infezione da HPV.
- 3. Papulosi bowenoide:** papule cutanee che interessano esclusivamente la zona genitale sia nell'uomo che nella donna. Sono lesioni cutanee precancerose dovute all'infezione da HPV ceppi 16,18,33.
- 4. Neoplasia intraepiteliale vulvare (VIN):** è una delle due lesioni precancerose del cancro vulvare. Il prurito continuo è un sintomo tipico del carcinoma vulvare.
- 5. Malattia di Paget della vulva:** lesione precancerosa della vulva assieme al VIN. Il prurito vulvare continuo e intenso è un sintomo tipico.
- 6. Carcinoma epidermoide:** tumore maligno della cute che può interessare anche la zona genitale.
- 7. Morbo di Paget extra mammario:** un carcinoma che compare spesso nella regione perineale e che appare simile ad una dermatite eczematosa pruriginosa.