

## SINTOMI della malattia

L'endometriosi da sovente dolori al basso ventre in maniera ciclica, durante o precedente le mestruazioni e durante il rapporto sessuale.

L'esame clinico-ecografico può mostrare masse a livello delle tube, dei suoi legamenti o delle ovaie. L'infertilità è anche una conseguenza potenziale dell'infiammazione e delle cicatrici prodotte dalla malattia.

La cistite interstiziale si presenta con dei dolori sovrapubici, un aumento della frequenza urinaria e l'apparizione di minzioni urgenti. Il sanguinamento intermestruale è possibile (spotting).

Alcune donne con endometriosi possono in rari casi estesa asintomatiche; altre con malattia di minima entità lamentano dolore fortissimo.

La dismenorrea è un importante sintomo ai fini della diagnosi, soprattutto se inizia dopo molti anni di mestruazioni relativamente indolori. I sintomi spesso diminuiscono o si risolvono durante la gravidanza.

I sintomi possono variare molto a seconda della localizzazione delle lesioni endometriotiche.

Intestino crasso: dolore durante la defecazione, diarrea, stipsi, o rettorragia durante le mestruazioni.

Vescica: disuria, ematuria, dolore sovrapubico o pelvico (in particolare durante la minzione), frequenza urinaria, incontinenza da urgenza o una combinazione di entrambi

Ovaie: formazione di un endometrioma (una massa ovarica cistica da 2 a 10 cm), che occasionalmente si rompe o sanguina, causando un dolore addominale acuto e segni di irritazione peritoneale

Strutture annessiali: formazione di aderenze annessiali, che formano una massa o dolore pelvici

Strutture extrapelviche (nell'addome alto): dolore addominale diffuso (a volte)

L'esame obiettivo della pelvi può risultare normale oppure i reperti possono comprendere utero fisso, ovaie ingrandite e/o dolenti, masse ovariche fisse, setto rettovaginale anormalmente ispessito, indurimento a livello dello spazio di Douglas, nodularità del legamento uterosacrale e/o masse annessiali.

Molto più rare sono le lesioni formatesi su vulva, collo uterino, vagina, ombelico o nella sede di cicatrici chirurgiche.

L'endometriosi si può manifestare fin da giovane e la sintomatologia rimane purtroppo molto variata nelle pazienti. A volte predomina il dolore durante o al di fuori del ciclo, ma altre manifestazioni, come difficoltà alla defecazione o alla minzione, o addirittura dolori durante i rapporti sessuali possono essere dei segni premonitori della malattia!! **Bisogno investigare!!**



L'endometriosi è una malattia CRONICA con manifestazioni cicliche dolorose. Diminuisce in modo variabile la fecondità della donna e progredisce con il tempo se non trattata.

Via Nassa 46 - 6900 **LUGANO**  
tel. 0041 91 9232242

Via Cantonale 54 - 6983 **MAGLIASO**  
tel. 0041 76 5160300

levatrice@studioginecologiabattaglia.com

[www.studioginecologiabattaglia.com](http://www.studioginecologiabattaglia.com)

  studioginecologiabattaglia